

Metsulfuron60
SIGMA

COMPOSICIÓN:

- **Principio activo:** Metsulfuron 60%
- **Acción:** Sistémica
- **Uso:** Post-emergente
- **Formulación:** gránulos dispersables
- **Banda toxicológica:** IV azul

DESCRIPCION GENERAL

METSULFURON 60 SIGMA, es un herbicida selectivo post-emergente para el control de malezas latifoliadas en cereales de invierno (trigo y cebada principalmente).

Se aplica en pre-siembra del cultivo o en post-emergencia desde que el cultivo de trigo tiene tres hojas hasta pleno macollaje y con malezas pequeñas en activo crecimiento. Se absorbe por raíz y hoja. Actúa afectando la síntesis de aminoácidos alifáticos de cadena ramificada (valina e isoleucina) debido a la inhibición de la enzima acetolactato sintetasa (ALS).

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Barbecho químico	Capiquí (Stellaria media)	5 - 7 g/ha + 2 - 2,5 l/ha de glifosato 48%	Con 50 a 60% de cobertura y según los intervalos necesarios de rotación para cada cultivo.
Cebada	Cien nudos (Polygonum aviculare) Enredadera anual (Polygonum convolvulus)	6 - 7 g/ha + 0,1 l/ha de dicamba o 80 cm ³ de picloram.	
Trigo	Nabo (Brassica campestris) Nabón (Raphanus sativus) Ortiga mansa (Lamium amplexicaule)	8 - 10 g/ha	Trigo: desde 3 hojas hasta encañazón. Malezas: en activo crecimiento, de 2 a 5 hojas.

CONSIDERACIONES

RECOMENDACIONES DE USO

METSULFURON 60 SIGMA; Periodo de carencia: Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir los siguientes períodos: Trigo: 30 días. Cebada: 90 días.

No aplicar el producto: en condiciones adversas para el cultivo (sequía, inundación, baja fertilidad del suelo, plagas o enfermedades); en suelos calcáreos o de pH > 8, debido a que el efecto residual aumenta; en cereales asociados a leguminosas; en ningún sistema de riego.

PRESENTACION

METSULFURON 60 SIGMA se comercializa en cajas de 2 kg. (20 sobres de 100 gramos)